

Instrukcja przygotowania do kolonoskopii preparatem CitraFleet® *


Badanie dnia

o godz.**w gabinecie 106/107, na I piętrze.**

Zastosowanie się do poniższych zaleceń ma istotne znaczenie dla bezpiecznego i skutecznego wykonania badania.

WAŻNE! Wypicie całych dwóch porcji roztworu CitraFleet® oraz dodatkowych 2 litrów klarownych niegazowanych napojów (np. wody) po każdej porcji roztworu, zgodnie z poniższym schematem gwarantuje dobre oczyszczenie jelita. Wypicie mniejszej ilości roztworu lub mniejszej ilości napojów, może spowodować niewystarczające oczyszczenie jelita i konieczność powtórzenia badania.

Zalecenia lekarskie:

Pierwsza porcja preparatu	Druga porcja preparatu	Zakończenie przygotowania
<p>W dniu badania godz. 6.00</p>	<p>W dniu badania, 4-5 godzin przed wyznaczoną godziną kolonoskopii</p>	<p>Zakończenie przygotowania</p>
<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; margin-right: 10px; text-align: center; width: 40px;">1</div> <div style="flex-grow: 1;">  <p>Rozpuścić zawartość 1 saszetki w ok. 150 ml (filiżanka) niegazowanej zimnej wody, mieszając 2-3 min. Powstanie ciepły, mętny roztwór.</p> </div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; margin-right: 10px; text-align: center; width: 40px;">2</div> <div style="flex-grow: 1;">Odczekaj, ok.30 min. i wypij go.</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; margin-right: 10px; text-align: center; width: 40px;">3</div> <div style="flex-grow: 1;"> <p>WAŻNE! Wypij minimum 2 litry niegazowanych napojów (np. woda, herbata, rozpuszczalna kawa, kompot).</p> </div> </div>	<p>Powtórz czynności</p> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; margin-right: 10px; text-align: center; width: 40px;">1</div> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; margin-right: 10px; text-align: center; width: 40px;">2</div> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; text-align: center; width: 40px;">3</div> </div>	<p>UWAGA: Pij dowolną ilość klarownych napojów (np. wodę, herbatę, kompot), ale zakończ ich przyjmowanie na 2 godziny przed wyznaczoną godziną badania.</p>

UWAGA:

1. Osoby regularnie zażywające leki przyjmują je zgodnie z zaleceniem lekarza, najlepiej 2 godziny przed lub po spożyciu preparatu przeczyszczającego.
2. Osoby, które mają problemy z regularnym wypróżnianiem powinny zastosować dodatkową jedną porcję preparatu, dzień przed badaniem, o godzinie 18.00.

**Dotyczy pacjentów, którzy mają badanie wyznaczone po godz. 15.00*