


**Badanie dnia** .....  
**o godz.** ..... **w gabinecie 106/107, na I piętrze.**

## Instrukcja przygotowania do kolonoskopii preparatem CitraFleet® \*

Zastosowanie się do poniższych zaleceń ma istotne znaczenie dla bezpiecznego i skutecznego wykonania badania.

**WAŻNE!** Wypicie całych dwóch porcji roztworu CitraFleet® oraz dodatkowych 2 litrów klarownych niegazowanych napojów (np. wody) po każdej porcji roztworu, zgodnie z poniższym schematem gwarantuje dobre oczyszczenie jelita. Wypicie mniejszej ilości roztworu lub mniejszej ilości napojów, może spowodować niewystarczające oczyszczenie jelita i konieczność powtórzenia badania.

### Zalecenia lekarskie:

Pierwsza porcja preparatu	Druga porcja preparatu	Zakończenie przygotowania
<p><b>W dniu badania godz. 6.00</b></p>	<p><b>W dniu badania, 4-5 godzin przed wyznaczoną godziną kolonoskopii</b></p>	<p><b>Zakończenie przygotowania</b></p>
<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; margin-right: 10px; text-align: center; width: 30px;">1</div> <div style="flex-grow: 1;">  <p>Rozpuścić zawartość 1 saszetki w ok. 150 ml (filiżanka) niegazowanej zimnej wody, mieszając 2-3 min. Powstanie ciepły, mętny roztwór.</p> </div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; margin-right: 10px; text-align: center; width: 30px;">2</div> <div style="flex-grow: 1;"> <p>Odczekaj, ok.30 min. i wypij go.</p> </div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; margin-right: 10px; text-align: center; width: 30px;">3</div> <div style="flex-grow: 1;"> <p><b>WAŻNE!</b> <b>Wypij minimum 2 litry</b> niegazowanych napojów (np. woda, herbata, rozpuszczalna kawa, kompot).</p> </div> </div>	<p>Powtórz czynności</p> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; margin-right: 10px; text-align: center; width: 30px;">1</div> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; margin-right: 10px; text-align: center; width: 30px;">2</div> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; text-align: center; width: 30px;">3</div> </div>	<p><b><u>UWAGA:</u> Pij dowolną ilość klarownych napojów</b> (np. wodę, herbatę, kompot), ale zakończ ich przyjmowanie na <b>2 godziny</b> przed wyznaczoną godziną badania.</p>

### UWAGA:

1. Osoby regularnie zażywające leki przyjmują je zgodnie z zaleceniem lekarza, najlepiej 2 godziny przed lub po spożyciu preparatu przeczyszczającego.
2. Osoby, które mają problemy z regularnym wypróżnianiem powinny zastosować dodatkową jedną porcję preparatu, dzień przed badaniem, o godzinie 18.00.

\*Dotyczy pacjentów, którzy mają badanie wyznaczone po godz. 15.00