



PRACOWNIA ENDOSKOPOWA Lubin, ul. Leśna 8 tel. (076) 7466220 lub 221,223

## PRZYGOTOWANIE DO BADANIA REKTOSKOPOWEGO

Badanie dnia .....

O godz. ....

### Na 2 dni przed badaniem:

Należy spożywać tylko dietę płynną: buliony, przecedzone zupy i soki, kisiel, budyń, galaretki owocowe, napoje niegazowane, soki, herbata.

### Badanie rano:

Wieczorem o godz. 20.00 wykonać wlewkę doodbytniczą (lewatywę) gotowym preparatem **RECTANAL**. Wlewkę można wykonać samodzielnie lub z pomocą drugiej osoby. W ułożeniu na lewym boku z nogami podgiętymi do brzucha, po rozchyleniu pośladek, nawilżeniu aplikatora na końcówce butelki, wprowadza się aplikator do odbytnicy na głębokość kilku centymetrów. Następnie należy wycisnąć zawartość pojemnika do odbytnicy. Czynność należy powtórzyć w dniu badania 1 godz. przed badaniem.

### Badanie popołudniu:

Badanie zaplanowano w godzinach popołudniowych, w dniu badania rano można pić, jednak ostatni płyn może być wypity nie później niż 7-8 godzin przed zaplanowanym terminem badania.

W przypadku kiedy pacjent przyjmuje leki np. z powodu nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca lub cukrzycy proszę przyjąć leki i popić niewielką ilością wody.

O godz. 08.00 wykonać wlewkę doodbytniczą (lewatywę) gotowym preparatem **RECTANAL**. Wlewkę można wykonać samodzielnie lub z pomocą drugiej osoby. W ułożeniu na lewym boku z nogami podgiętymi do brzucha, po rozchyleniu pośladek, nawilżeniu aplikatora na końcówce butelki, wprowadza się aplikator do odbytnicy na głębokość kilku centymetrów. Następnie należy wycisnąć zawartość pojemnika do odbytnicy. Czynność należy powtórzyć w dniu badania 1 godz. przed badaniem.

**RECTANAL** można zakupić w aptece bez recepty.